

# 110 年托育人員參考題庫

1. ( 3 ) 應何時開始為孩子做口腔清潔的工作？①斷奶後②開始長牙時③從初生開始④滿月後。
2. ( 4 ) 下列何者不是可以開始如廁訓練的原則？①孩子願意自己坐在馬桶上②孩子會表達便意③孩子的大小號次數及時間固定④孩子已經滿二歲了。
3. ( 4 ) 下列何者是三歲孩子可以做的家事？A. 自己去倒垃圾；B. 澆花；C. 洗碗筷；D. 摺衣服。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
4. ( 1 ) 下列敘述何者錯誤？①保母忙碌時，可以把奶瓶架著讓孩子自己喝奶②泡奶時應先加冷水再加熱水③人工哺乳時，奶嘴應充滿奶水④孩子自己可以握奶瓶時，可以換成塑膠奶瓶。
5. ( 4 ) 下列敘述何者錯誤？①為嬰幼兒選擇適合體型且其繩帶不超過 14 公分的衣服②餵嬰幼兒食物之前，應先確定溫度是否適當③家有學步兒時，應避免使用桌巾或垂下來的桌墊④為了讓孩子學習適應家庭生活，應避免在地磚上鋪設軟墊。
6. ( 3 ) 下列敘述何者錯誤？①即使是孩子乘坐機車，亦應戴合適的安全帽②應避免讓孩子坐汽車前座③帶孩子上下公車時，都應該讓孩子走前面④娃娃推車應避免使用手扶梯。
7. ( 2 ) 正常滿周歲的小孩，其體重約為出生體重的幾倍？①2 倍②3 倍③4 倍④5 倍。
8. ( 1 ) 第一次替嬰兒添加含鐵副食品，應從下列何者開始著手？①添加鐵的穀粉②蛋黃③深綠色蔬菜④肉類。
9. ( 2 ) 菠菜等顏色深綠的蔬菜，富含以下何種營養素？A. 維生素 A；B. 維生素 B；C. 維生素 C；D. 維生素 D。①AB②AC③ABC④BCD。
10. ( 3 ) 寶寶感冒拉肚子時，下列何種處理方式是錯誤的？①暫時不喝牛奶②請教醫師是否暫時改用止瀉奶粉③多吃蛋以補充營養④喝米湯。
11. ( 4 ) 下列哪一項敘述不符合「均衡飲食」的原則？①不偏食②每天吃六大類食物③食物種類越多越好④每人每日各類食物營養素攝取量相同。
12. ( 2 ) 嬰兒應給予適度的日光浴，以幫助製造下列哪種維生素？①A②D③E④C。
13. ( 4 ) 「電視」是造成幼兒肥胖的原因之一，下列敘述何者錯誤？①看電視時不動，減少了活動量②看電視時吃東西，增加熱量攝取③吃電視廣告的食物，多半是高脂肪、高熱量食物④電視有輻射線。
14. ( 3 ) 幼兒運動後，最好選用下列哪一種飲料以補充水分？①開水中加一點鹽②運動飲料③白開水④果汁。
15. ( 1 ) 嬰兒缺乏下列哪一種脂肪酸，易產生濕疹樣皮膚炎？①亞麻油酸②次亞麻油酸③天門冬酸④花生油酸。
16. ( 3 ) 防治口角炎和舌炎的維生素是①A②B1③B2④C。
17. ( 1 ) 保母如何有效率的運用時間？①每天睡前，先把環境稍作整理，將次日幼兒需要的材料和用具準備好，放在固定的地方②為好好照顧幼兒，餐點最好外買③為節省時間，所有的事要一口氣做完④孩子不哭鬧的時候完成家事。
18. ( 3 ) 三歲幼兒平均身高約為①75 公分②85 公分③95 公分④105 公分。

19. ( 4 ) 四至七個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？①米糊②蔬菜泥③果汁④蛋黃。
20. ( 1 ) 七~九個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？①全蛋②豆腐③肝泥④麵線。
21. ( 4 ) 十一個月大的嬰兒，不適合下列何種食物？①魚鬆②饅頭③乾飯④鮮乳。
22. ( 4 ) 蜂蜜中可能含有何種菌種，所以不適合嬰兒食用？①乳酸桿菌②大腸桿菌③腸炎弧菌④肉毒桿菌。
23. ( 2 ) 處理副食品時，若手部有傷口易產生何種污染？①腸炎弧菌②金黃色葡萄球菌③仙人掌桿菌④沙門氏菌。
24. ( 4 ) 烹調雞蛋前需先將雞蛋洗淨，否則易有何種細菌污染？①肉毒桿菌②腸炎弧菌③乳酸桿菌④沙門氏菌。
25. ( 3 ) 夏天氣候潮濕穀類容易發霉，其中對身體危害最大的黴菌毒素為①綠麴毒素②紅麴毒素③黃麴毒素④黑麴毒素。
26. ( 4 ) 嬰幼兒飲食中缺乏鐵質會造成①溶血性貧血②地中海貧血③巨球性貧血④小球性貧血。
27. ( 4 ) 動物性食品中含有何種維生素，可避免幼兒產生惡性貧血？①B1②B2③B6④B12。
28. ( 2 ) 幼兒缺乏何種維生素易產生佝僂症？①A②D③E④K。
29. ( 1 ) 幼兒軟骨症是缺乏何種礦物質？①鈣②鐵③鈉④鎂。
30. ( 4 ) 幼兒飲食中鹽分過高，會造成下列何種問題？A. 腎臟負擔；B. 高血壓；C. 心臟病；D. 齲齒。①ABD②ACD③ABCD④ABC。
31. ( 4 ) 幼兒發燒時，不宜選擇①高營養②易消化③半流質④水分少的食物。
32. ( 1 ) 副食品提供胡蘿蔔，因其富含①維生素 A②維生素 B③維生素 C④維生素 E。
33. ( 2 ) 幼兒喜歡吃甜食容易引發下列何種症狀？A. 食慾不振；B. 高血壓；C. 肥胖；D. 齲齒。①ABC②ACD③ABD④BCD。
34. ( 2 ) 下列敘述何者正確？①燉煮雞肉後雞湯比雞肉營養②幼兒若素食則應多補充鐵質和維生素B12③蛋黃含高膽固醇幼兒應少食用④選用低敏奶粉可以提高嬰兒的免疫力。
35. ( 1 ) 下列何者較不易引起嬰兒食物過敏？①米糊②全蛋③牛乳④豆漿。
36. ( 4 ) 對嬰兒營養攝取的建議，下列敘述何者不正確？①嬰兒每公斤體重需 100 大卡的熱量②母乳中含有多元不飽和脂肪酸 (DHA、EPA)，牛乳則缺乏③餵食母乳的嬰兒通常有較高的鈣吸收率④配方奶因添加鐵質所以吸收率較母乳好。
37. ( 3 ) 母乳中何種礦物質的含量比牛乳高，且嬰兒的吸收率也較好？①錳②鋅③鐵④鉀。
38. ( 2 ) 對脂漏性皮膚炎嬰兒的處理，下列何者正確？A. 患部常予擦拭乾淨，但不可用肥皂；B. 可用指甲先輕輕剝除痂皮後再清洗；C. 患部用嬰兒油塗抹軟化溶解後，再以清水洗淨；D. 已呈紅疹則以濕疹藥膏少量塗抹。①ABCD②ACD③BCD④ABC。

39. ( 3 ) 為減少嬰兒發生溢奶，下列何者正確？A. 餵奶時平靜緩慢；B. 餵奶後不要和嬰兒劇烈地玩耍；C. 嬰兒餓哭時才給予餵奶；D. 餵奶後睡覺頭墊高或右側臥；E. 餵奶後給予拍背打嗝排氣。①ABCD②ABCE③ABDE④BCDE。
40. ( 3 ) 嬰兒發展咀嚼和吞嚥技巧的關鍵期在①一～二個月②三～四個月③六～十二個月④斷奶後。
41. ( 2 ) 幼兒何時適合開始大小便訓練？①開始添加副食品時②一歲以後可以站立時③八～九個月學爬階段④滿月後即可。
42. ( 1 ) 新生兒臍帶護理，下列何者正確？A. 洗澡時儘量勿弄濕臍帶；B. 洗完澡以75%酒精消毒臍帶；C. 肚臍及四周皮膚有發紅、異味及分泌物，應立即就醫；D. 臍根部以95%酒精促進乾燥；E. 包尿布時要將臍帶包住保護著。①ABCD②BCDE③ABDE④ABCE。
43. ( 1 ) 為嬰兒選擇鞋子的原則，下列敘述何者正確？A. 鞋子前頭應比腳趾寬 B. 鞋子長度應比嬰兒站著畫好的足形長半吋 C. 穿膠底鞋較柔軟不易滑倒 D. 選擇露出腳趾可以自由活動的鞋款。①AB②AC③CD④BD。
44. ( 2 ) 為幼兒規劃安全環境，須注意哪些原則？A. 插座安裝在幼兒觸及不到的地方；B. 在幼兒身高以下的牆面，避免有突出物；C. 地面上鋪地毯，餐桌上鋪桌巾；D. 傢俱安置穩定，矮櫃裝有玻璃；E. 階梯加防滑條，窗戶設有限開裝置。①ABD②ABE③BCD④CDE。
45. ( 3 ) 選購嬰兒衣著應考量的安全原則，下列何者正確？①選用配合嬰兒體型的套頭衫②色彩亮麗鮮艷予以感官刺激③質料柔軟不褪色無飾物④幼兒衣服要有活動繩帶，方便穿脫。
46. ( 3 ) 嬰兒作日光浴的照護原則，下列何者正確？A. 嬰兒滿月體重約4公斤，健康狀態良好即可做；B. 從腳尖起每次2分鐘開始增加；C. 以直射且強烈的陽光照射為佳；D. 做完後須立刻擦拭汗水補充水分。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
47. ( 4 ) 下列哪些是協助養成嬰兒良好睡眠的作法？A. 蓋被輕軟、溫暖、舒適；B. 俯臥嬰兒的睡墊或被窩力求柔軟；C. 通風良好、冷氣風扇不直吹；D. 光線柔和、環境安靜；E. 讓嬰兒在懷中抖動、拍背入睡。①ABE②BCD③CDE④ACD。
48. ( 2 ) 訓練嬰兒獨睡的最佳時期為①三個月②六個月③九個月④一歲以後。
49. ( 2 ) 下列哪一項是最適合為嬰兒選用的第一種固體食物？①肉泥②米糊③豆腐泥④蛋黃泥。
50. ( 3 ) 嬰兒不適合在發燒或拉肚子時補充運動飲料，是因為那個器官功能尚未成熟？①肝臟②肺臟③腎臟④心臟。
51. ( 4 ) 下列有關斷奶的敘述，下列何者錯誤？①斷奶的目的是為讓嬰兒學習咀嚼能力②斷奶並非不再喝奶，而是指脫離奶瓶，慢慢學習使用其他餐具③斷奶宜採取漸進的方式④斷奶食物要有固定的口味。
52. ( 2 ) 給嬰兒餵奶吸吮時間以不超過多少時間為宜？①15分鐘②30分鐘③45分鐘④1小時。
53. ( 2 ) 下列有關嬰幼兒的餵食方式，何者錯誤？①保母採用懷抱方式，以奶瓶餵食嬰兒②用被子固定嬰兒的手和奶瓶的位置，讓嬰兒儘早學著自己拿奶瓶

<p>喝奶③避免嬰兒或學步兒吸著奶瓶入睡④學步兒自己用奶瓶進食時，採用坐姿或墊高其頭部。</p>
<p>54. ( 1 ) 有關嬰兒副食品餵食的敘述，下列何者正確？①讓寶寶養成先吃副食品再喝奶水的習慣②可以將米粉、麥粉直接加在奶水中餵食③五穀根莖類的副食品，先由麥粉開始餵食④為了增加寶寶的營養，可以用排骨熬湯來沖泡奶粉。</p>
<p>55. ( 2 ) 有關嬰兒睡眠照顧的敘述，下列何者是正確的？A. 應該替嬰兒準備專用的床及專屬寢具；B. 在嬰兒尚未能抬頭翻身前，不要採取俯臥；C. 嬰兒喝奶後應採右側睡姿；D. 為方便照顧，嬰兒應與大人同床同被。①ABCD②ABC③ABD④BCD。</p>
<p>56. ( 2 ) 下列何者是為嬰幼兒換尿布與協助如廁的適當作法？A. 嬰幼兒大便後應以溫水清洗屁股；B. 過程中與嬰幼兒聊天，讓他們感到輕鬆與溫暖；C. 隨著幼兒的發展，可設置幼兒自行如廁的設備；D. 對於幼兒如廁的突發狀況，應嚴正處理讓幼兒學習不再犯。①ABCD②ABC③ABD④BCD。</p>
<p>57. ( 2 ) 所謂初乳是指產後①第 1 天②第 1~5 天③第 1~30 天④第 1~60 天所分泌的乳汁。</p>
<p>58. ( 4 ) 市售鮮奶不適合餵食新生兒，因其成分有比母乳高二倍以上的①礦物質與維生素②乳糖與脂肪③維生素與脂肪④蛋白質與礦物質。</p>
<p>59. ( 1 ) 餵食母乳的嬰兒，最早應添加營養素為①鐵質②鈣質③維生素 A④維生素 C。</p>
<p>60. ( 4 ) 母乳適合嬰兒消化吸收不易便秘，因其蛋白質中的乳清蛋白與酪蛋白的比例為①20：80②40：60③50：50④80：20。</p>
<p>61. ( 3 ) 初乳與成熟乳相比較，初乳何種成分較成熟乳含量高？①熱量②乳糖③蛋白質④脂肪。</p>
<p>62. ( 4 ) 脫脂奶不適合嬰兒食用，主要是因為無法提供足夠的①核糖核酸②苯丙胺酸③花生四烯酸④亞麻油酸。</p>
<p>63. ( 2 ) 嬰兒維生素 D 不足時，會造成①血鉀過低症②血鈣過低症③血鈉過低症④血糖過低症。</p>
<p>64. ( 4 ) 餵食母乳的母親若為素食者，嬰兒應補充何種營養成分？①維生素 D②蛋白質③維生素 C④維生素 B。</p>
<p>65. ( 3 ) 嬰兒從母乳或配方奶中攝取的主要醣類為①葡萄糖②果糖③乳糖④麥芽糖。</p>
<p>66. ( 2 ) 有關嬰兒固體食品的選擇，下列何項最為正確？①蛋白在未滿一歲時即可餵食②乾穀類可與適當的配方食品混合使用③果汁中應加些糖和開水稀釋④蜂蜜可提昇甜度、熱量及特殊營養成分。</p>
<p>67. ( 3 ) 下列哪些是幼兒生長停滯的原因？A. 吃高蛋白質高熱量食品；B. 吃許多垃圾食物；C. 吸收不良；D. 食慾減低。①ABCD②ABC③BCD④ABD。</p>
<p>68. ( 1 ) 下列食物何者為幼兒吸收鈣的最佳來源？①奶水及乳製品②肉類③甜點心④蔬菜水果。</p>
<p>69. ( 3 ) 添加麥粉時，以何種方式給予最適宜？①與配方奶粉一起泡入奶瓶中吸食②單獨泡入奶瓶中吸食③調成糊狀以湯匙餵食④與肉湯一起泡入奶瓶中吸食。</p>

70. ( 4 ) 在營養攝取均衡的狀況下，幼兒週歲時，其身高比出生時約增加①20%②30%③40%④50%。
71. ( 1 ) 下列何者不是嬰兒咀嚼能力的基礎？①吸吮②吞嚥③切斷④磨碎。
72. ( 3 ) 配方奶粉易造成齲齒及肥胖，主要是因其中含有①乳糖②半乳糖③蔗糖④蛋白質。
73. ( 4 ) 因母乳中含下列何種成分較少，所以母乳比牛乳營養且容易消化吸收？①必需胺基酸②免疫球蛋白③乳清蛋白④酪蛋白。
74. ( 1 ) 母乳比牛乳容易消化吸收，因為母乳比牛乳含較多的①乳糖②蛋白質③鈣④鈉。
75. ( 3 ) 乳糖可以幫助消化吸收，是因其在腸道內可促進下列何者之生長？①大腸桿菌②痢疾桿菌③乳酸桿菌④沙門桿菌。
76. ( 2 ) 下列敘述何者錯誤？①嬰兒體重的增加，是成長與健康的重要指標②身高增加的變化大於體重增加的變化③身高比體重更易受遺傳的影響④嬰幼兒智力的發展與飲食有關。
77. ( 4 ) 下列敘述何者正確？①嬰兒喝剩的牛奶，可存放在冰箱內，讓嬰兒下一餐餵奶時再度食用②市售奶粉都適合用來哺育 1 歲以下嬰兒③奶水太冷時，可放入微波爐中加熱後立即哺餵④餵奶時與嬰兒身體接觸，可促進嬰兒發展。
78. ( 2 ) 下列敘述何者正確？①週歲以上的幼兒開始對食物有好惡之心，尤其喜歡甜食，所以要多供應②一歲半幼兒的食物仍需製備成適合幼兒腸胃吸收的細軟質地③幼兒吃不完的食物可轉給其他幼兒吃，以免浪費④幼兒所需的熱量和營養素都是大人的 1/2。
79. ( 3 ) 下列敘述何者錯誤？①嬰兒可從初乳中獲得對疾病的抵抗力②讓嬰兒喝母乳，可促進親子關係，並有安定嬰兒情緒的作用③嬰兒斷奶的真正意義是不再喝母乳，開始學習吃其他食物④避免嬰兒腸胃敏感及吐奶，宜採用少量多餐方式。
80. ( 2 ) 有關嬰兒餵奶的敘述，下列何者不適宜？①餵奶時宜小心，避免發生溢奶，以免吸入溢出的奶水而導致肺炎②定時定量，每 4 小時餵 1 次③餵奶時，奶嘴應充滿奶水④預防嬰兒吐奶，應於進食後輕拍背部，協助打嗝排出空氣。
81. ( 4 ) 下列敘述何者正確？①嬰兒在 4 個月左右可開始補充肉類食品②解凍肉類時，直接泡於熱水中較迅速方便且衛生③牛奶的營養價值高，可任意烹調或添加食物滾煮後哺餵④肉類富含維生素 B 群，對幼兒來說有營養價值。
82. ( 1 ) 下列敘述何者錯誤？①六大類食物都是增進健康的食品，多吃無妨②幼兒的食物越多樣化，越不會造成偏食的習慣③蔬菜含有豐富的營養素與纖維質，應鼓勵幼兒多吃④成人的飲食習慣深深影響著幼兒。
83. ( 4 ) 下列敘述何者正確？①點心就是零食，零食就是點心②幼兒三餐應定時定量，兩餐間不需再提供點心③根莖類食物易使腸胃脹氣，不適合當做幼兒點心④正餐外，應提供幼兒低糖、低脂肪的食物當做點心。
84. ( 4 ) 依衛生福利部公布的幼兒每日飲食建議量，哪一類食物攝取量最多？①豆魚肉蛋類②蔬菜類③水果類④全穀根莖類。

85. ( 3 )	嬰兒副食品中，蛋黃泥可供應下列何種營養成分？A. 蛋白質；B. 鐵質；C. 膽固醇 D. 纖維質。①ABCD②ABC③BC④AB。
86. ( 4 )	有關嬰兒副食品「蘋果」的製作，下列敘述何者錯誤？①蘋果汁應稀釋後再給予②可提供豐富維生素C③蘋果含有果膠，可預防便秘也可治療腹瀉④蘋果褐變後，會使營養素流失。
87. ( 3 )	下列食物何者比較適合做為幼兒點心？①蛋糕和沙琪瑪②炸雞和薯條③全麥麵包和雞蛋布丁④豆花和洋芋片。
88. ( 2 )	有關乳汁的分泌，下列敘述何者正確？①為了確保寶寶有吃到後段奶，所以一次應該只餵一側乳房②母親的奶水量會隨嬰兒有效吸吮的次數及時間增加而增加③乳房大小會影響乳房泌乳量④哺餵母乳的嬰兒，兩餐間要給嬰兒餵食葡萄糖水。
89. ( 1 )	有關母親奶水量不足常見的原因，下列敘述何者錯誤？①乳房太小②太晚開始第一次哺乳③餵食次數不夠頻繁④嬰兒只含住乳頭以致吸吮刺激量不足。
90. ( 2 )	有關哺餵母乳，下列敘述何者錯誤？①應在出生後儘早開始哺餵母乳②哺餵母乳的嬰兒應常補充葡萄糖水③觀測嬰兒體重及尿量是評估母乳哺餵是否足夠的方法④哺餵母乳的嬰兒，在6個月大應添加適當的副食品。
91. ( 4 )	哺餵母乳時，下列何者為乳頭破皮最常見的原因？①嬰兒吸奶次數太頻繁②媽媽奶水過多③太少做乳房護理④嬰兒含奶姿勢不正確。
92. ( 2 )	有關於給足月健康嬰兒食用的奶水儲存的敘述，何者錯誤？①成熟奶放於室溫 25°C，可放置 6-8 小時②成熟奶放於冰箱 4°C 內冷藏，可放置至少 7 天③成熟奶放於 -20°C 以下，可放置至少 3 個月④冰過的奶水不宜用微波爐加熱。
93. ( 3 )	有關餵食配方奶，下列敘述何者錯誤？①沖泡嬰兒配方奶粉時，應先確認奶粉罐上的保存期限②應以隨罐所附的量匙，按其標示水量泡奶③罐上標示一匙奶粉 30cc 的水，則泡奶時應先放水，再加奶粉一匙泡成 30cc 的奶水④餵食配方奶不可使用微波爐加熱。
94. ( 3 )	有關嬰幼兒食物過敏，下列敘述何者錯誤？①有過敏家族史，應盡量哺餵母乳②副食品添加時，應留意幼兒是否有過敏反應③找出引發過敏食物後，應多食用以降低敏感程度④幼兒 6 歲以後過敏症狀會逐漸減少。
95. ( 2 )	有關添加副食品的原則，下列敘述何者正確？①副食品應加些鹽調味以免腹脹②添加副食品時仍應持續哺乳③可隨時添加各類副食品④7 個月後即可使用全蛋。
96. ( 3 )	有關世界衛生組織對嬰幼兒營養及餵食的建議，下列敘述何者正確？①嬰兒三個月就應開始添加副食品，以補充母乳營養之不足②母乳含有的免疫抗體只能持續六個月，之後就應改餵配方奶③哺餵母乳六個月後添加副食品，仍可持續哺餵母乳到兩歲④目前配方奶的營養成分已與母乳類似，故可以取代母乳。
97. ( 3 )	在食安事件中，不肖廠商於嬰兒奶粉中添加三聚氰胺的主要目的為何？①預防嬰兒奶粉酸敗②提高防腐作用③提高氮含量，以通過蛋白質含量檢測④避免嬰兒奶粉受潮。

98. ( 2 ) 幼兒有舌炎的症狀，可能缺乏下列何種營養素？①維生素 A②維生素 B③維生素 C④維生素 E。
99. ( 4 ) 當幼兒攝取過多甜點、含糖飲料、油炸食物、肉製品，最後都會轉變成下列何者貯存於體內？①葡萄糖②果糖③蛋白質④脂肪。
100. ( 2 ) 下列何種營養素，懷孕婦女若服用過量可能導致胎兒畸型？①葉酸②維生素 A③維生素 B④維生素 B。
101. ( 2 ) 幼兒所需的完全蛋白質可由下列何種食物獲得？①菜豆②魚③麵包④玉米片。
102. ( 2 ) 若一位 4 歲男孩的身體質量指數(BMI)為 20，對其營養輔導建議，下列敘述何者錯誤？①適當的運動②每日增加食物熱量為 2000 大卡③幼兒園提供幼兒及家長相關的營養教育④以幼兒食物金字塔指南攝取六大類食物。
103. ( 4 ) 有關食物過敏，下列敘述何者錯誤？①嬰幼兒較容易對食物產生過敏②過敏反應嚴重時，會造成血壓下降，甚至休克的現象③食物過敏通常是吃下食物後，幾分鐘到幾小時內發作④食物過敏是指胃腸道與過敏原兩者之間相互作用的結果。
104. ( 1 ) 台灣地區各年齡層民眾，何種營養素攝取皆未達建議攝取量？①鈣②鐵③磷④鎂。
105. ( 2 ) 有關全球嬰幼兒的餵食概念，下列敘述何者正確？①出生四小時後開始學習吸吮母乳②嬰兒六個月前完全哺餵母乳③副食品越早開始餵食越好④於周歲停餵母乳。
106. ( 3 ) 有關嬰兒配方奶粉中的阪崎氏腸桿菌，下列敘述何者錯誤？①新生兒尤其是早產、體重不足和免疫力較弱的嬰兒感染的風險最高②避免受到此菌感染，首要須把哺餵和沖調嬰兒配方奶粉的所有器具加以清洗和消毒③沖泡嬰兒配方奶粉可以 70°C 的熱水沖調，並於室溫下靜置冷卻 2 個小時後飲用最佳④嬰兒受阪崎氏腸桿菌感染的發生率並不高。
107. ( 1 ) 預防接種後，接種部位會產生潰爛而後再結疤的是哪種疫苗？①卡介苗② B 型肝炎③水痘④日本腦炎。
108. ( 1 ) 有關孩子發燒的處理方式，下列何者正確？①鼓勵多攝取水分②涼水拭浴③自行使用退燒藥④緊閉窗戶，不要吹到風。
109. ( 3 ) 接種卡介苗用來預防何種疾病？①天花②麻疹③結核病④百日咳。
110. ( 3 ) 「新生兒先天代謝異常篩檢」可篩檢下列哪種疾病？①先天性心臟病②遺傳性血友病③蠶豆症④氣喘。
111. ( 3 ) 下列何種狀況可能是幼兒眼睛有問題？A. 兩眼無法同時跟著物件移動；B. 走路常無故撞到傢俱；C. 兩眼各朝一方轉動；D. 晨起時眼睛有些許分泌物。①ABD②ACD③ABC④BCD。
112. ( 4 ) 下列哪種狀況可能會影響幼兒的聽力？A. 慢性中耳炎；B. 耳朵受到嚴重撞擊；C. 長期接受高分貝的噪音；D. 耳朵進水。①ABD②ACD③BCD④ABC。
113. ( 1 ) 幼兒罹患玫瑰疹最常見的合併症是①熱性痙攣②腦膜炎③肺炎④中耳炎。
114. ( 2 ) 下列何者為燒燙傷處理的正確步驟？①沖、泡、脫、蓋、送②沖、脫、泡、蓋、送③脫、泡、沖、蓋、送④泡、沖、脫、蓋、送。
115. ( 2 ) 下列何者為新生兒嚴重性脫水徵象之一？①精神亢奮②前囟門凹陷③皮膚紅疹④鼻翼擴張。



116. ( 2 ) 預防嬰幼兒意外傷害，下列何者正確？①禁止室外活動②設置安全環境③交由幼兒兄姐看顧④照顧者定時探望孩子。
117. ( 2 ) 手提加壓式乾粉滅火器的使用順序是：A. 拆斷封條；B. 壓下二氧化碳鋼瓶壓板；C. 從噴嘴座上拔出噴嘴管；D. 在有效射程，緊壓噴嘴，將乾粉射入火焰基部。①ABCD②ACBD③ACDB④ABDC。
118. ( 4 ) 有關安全門的敘述，下列何者正確？①應採塑膠材質②平時應上鎖以免小偷進入③安全門周圍空間可堆置物品④安全門應附有自動關閉裝置，兼具阻止火的延燒及煙的傳播作用。
119. ( 2 ) 為預防嬰兒溢奶，下列何者是在餵食後最適宜採取的姿勢？①左側臥抬高床頭②右側臥抬高床頭③平躺抬高床頭④俯臥抬高床尾。
120. ( 3 ) 預防嬰幼兒感染腸病毒的方法，下列何者方式最適宜？①按時接種預防注射②服用預防性抗生素③注意衛生經常洗手④服用大量維生素。
121. ( 3 ) 依新生兒黃疸的發生時間，下列何者是屬於病理性黃疸？A. 出生後立即出現；B. 出生後第三天；C. 出生後第五天；D. 出生後第二十天仍有黃疸。①AB②AC③AD④BD。
122. ( 1 ) 有關罹患氣喘幼兒的照護，下列何者正確？①避免情緒過於激動②限制水分攝取③鼓勵多吃奶類製品④鼓勵多吃高脂食物。
123. ( 4 ) 嬰幼兒健康檢查的項目，下列何者錯誤？①身體檢查②測量身高、體重③發展測驗④智力測驗。
124. ( 4 ) 便秘幼兒應多攝取下列哪類食物？①高糖②高脂肪③高蛋白④高纖維。
125. ( 1 ) 電器火災最有效的滅火方式，下列何者正確？①乾粉滅火器②泡沫滅火器③水柱④沙。
126. ( 1 ) 下列何者是有毒的植物？①聖誕紅②石榴③玫瑰④菊花。
127. ( 4 ) 家庭環境的健康要素，下列何者錯誤？①穩定的室溫②良好的通風設備③無噪音④無細菌的空氣。
128. ( 4 ) 有關嬰幼兒衛生保健的敘述，下列何者錯誤？①健康是幸福之本②健康的下一代是家庭快樂之源③優生強種是國家民族之根④健康就是指身體沒有疾病。
129. ( 2 ) 登革熱的傳染媒介是：A. 埃及斑蚊；B. 三斑家蚊；C. 白線斑蚊；D. 環紋家蚊。①AB②AC③BC④BD。
130. ( 1 ) 罹患下列何種疾病後可產生終身免疫？①德國麻疹②瘧疾③登革熱④流行性感冒。
131. ( 1 ) 嬰幼兒給藥方法，下列何者正確？①先用開水將藥粉溶化後再餵②將藥物加入牛奶中一併餵食③任何藥物應等睡醒時再給予，不需定時④感冒時口服一般成藥。
132. ( 2 ) 處理幼兒眼球外傷，下列何者正確？①先點眼藥水②雙眼一起覆蓋包紮後送醫③儘快擦拭眼睛內的血塊④喝點牛奶安撫幼兒情緒。
133. ( 1 ) 給嬰幼兒點眼藥的方法，下列何者正確？①應點於下眼瞼②眼藥水應滴於眼球正中央③眼藥膏應抹擦於眼球正中央④先點眼藥膏再點眼藥水。
134. ( 3 ) 以耳溫槍為二歲幼兒測量耳溫時，下列何者為正確拉耳朵的方法？①往上往後拉②往上往前拉③往下往後拉④往下往前拉。



135. ( 3 ) 嬰幼兒點完耳藥後的處理方式，下列何者正確？①以棉球塞住耳道②以OK繃貼於患耳③協助側躺約5分鐘④立即可正常活動。
136. ( 1 ) 傳染病發生時，保母人員對嬰幼兒應採取的措施，下列何者正確？①儘量避免帶至公共場所②暫時不收托嬰幼兒③給予服用預防性的抗生素④給予高脂肪飲食增加抵抗力。
137. ( 1 ) 當保母發現自己罹患肺結核且具傳染性時，下列措施何者正確？①暫時不收托嬰幼兒②可收托並同時服藥治療③暫時不收托嬰兒，但可收托年齡較大的幼兒④嬰幼兒皆有預防注射，可持續收托。
138. ( 3 ) 幼兒誤食酸性化學溶劑，送醫前的處理方式，下列何者最適宜？①催吐②給予飲用鹼性飲料③給予飲用牛奶④給予飲用運動飲料。
139. ( 3 ) 罹患結膜炎幼兒的處理方式，下列何者正確？①帶眼罩②沖洗眼睛③避免共用毛巾且多洗手④服用抗生素。
140. ( 4 ) 兒童癌症的早期徵象，下列何者不正確？①不明原因長期發燒②不明原因疼痛③經常臉色蒼白④嗜睡。
141. ( 1 ) 幼兒給藥的原則，下列何者正確？①依據醫師處方指示用藥②症狀減輕後即可自行停藥③不慎給藥過量，下次給藥自動減量④吃剩藥物可留給其他孩子服用。
142. ( 3 ) 幼兒看電視最適宜的距離，應保持電視畫面對角線的幾倍？①2~4倍②4~6倍③6~8倍④8~10倍。
143. ( 4 ) 最適合協助幼兒刷牙的時間，下列何者正確？①早上起床時②睡覺前③早上起床時及睡前④每次進食後。
144. ( 2 ) 下列何者是幼兒服藥後最常見的過敏反應症狀？①發燒②皮膚產生紅疹③貧血④嘔吐。
145. ( 1 ) 幼兒疑似有服藥過敏的現象，下列處理方式何者最適宜？①停止服藥立即送醫②停止服藥繼續觀察③服藥皆有可能過敏反應，不必在意④多喝牛奶稀釋藥物。
146. ( 3 ) 為增加幼兒服藥的接受度，可於藥物中添加下列何物？①牛奶②可樂③糖漿④果汁。
147. ( 3 ) 處理幼兒衣服著火，最適宜的處理方式是①讓幼兒在地上翻滾②叫幼兒快跑，讓風吹熄火焰③用厚重衣料緊緊裹住幼兒④用衣服拍打幼兒身上火焰。
148. ( 4 ) 下列何者為嬰兒頭部前囟門關閉的時間？①6~8週②12~18週③6~8個月④12~18個月。
149. ( 2 ) 為幼兒拍痰的注意事項，下列何者正確？①讓幼兒平躺，輕輕拍擊胸部②讓幼兒多喝水以稀釋痰液③餵完奶半小時即可拍痰④為幼兒多穿幾件衣服保暖。
150. ( 4 ) 嬰幼兒發生抽搐的處理方式，下列何者正確？①固定四肢避免碰撞②給予喝些溫開水③撬開牙齒塞入壓舌板④將頭側一邊以利呼吸道通暢。
151. ( 3 ) 執行嬰兒人工呼吸，應採下列哪種方式？①口對口②口對鼻③口對口鼻④口對口或對鼻皆可。
152. ( 1 ) 幼兒有手足口症及咽峽炎的症狀，是被下列何種病原體感染？①腸病毒②腺病毒③寄生蟲④皰疹病毒。

153. ( 1 ) 呼吸道傳染病的傳染途徑為何？①飛沫/空氣②糞口③血液/體液④飲食。
154. ( 3 ) 下列何者不是呼吸道傳染病？①流感②百日咳③愛滋病④水痘。
155. ( 1 ) 預防呼吸道傳染病的方法，下列何者錯誤？①安全的性行為②避免出入人潮擁擠、空氣不流通之公共場所③注意個人衛生習慣，提升個人免疫力④按時預防接種。
156. ( 2 ) 下列何者是目前無疫苗可預防接種的傳染病？①百日咳②腸病毒③水痘④麻疹。
157. ( 4 ) 下列何者不是流感的症狀？①咳嗽、流鼻水、喉嚨痛②肌肉痛③頭痛、發燒④皮膚癢。
158. ( 3 ) 預防流感的方法，下列何者錯誤？①按時接種流感疫苗②注意個人衛生習慣，提升自我免疫力③安全的性行為④避免出入人多擁擠的場合。
159. ( 2 ) 下列何者不是水痘的傳染方式？①空氣傳染②糞口傳染③飛沫傳染④皮膚直接接觸水痘液。
160. ( 2 ) 下列何者為百日咳的傳染方式？①空氣傳染②飛沫傳染③皮膚接觸傳染④糞口傳染。
161. ( 1 ) 下列何者為流感的傳染方式？①空氣/飛沫傳染②糞口傳染③皮膚接觸傳染④飲食傳染。
162. ( 4 ) 托育場所內發生傳染病時，為預防疫情散播，應採取下列何種處理方式？A. 有疑似症狀者，應立即就醫；B. 保持室內清潔通風，避免過於擁擠；C. 玩具、遊樂設備等共用設施，應停用並即時消毒；D. 給予疫苗接種。①ACD②ABD③BCD④ABC。
163. ( 1 ) 下列哪一項是腸病毒的生物特性？①怕含氯漂白水②耐強鹼③耐高溫④抗紫外線。
164. ( 4 ) 在臺灣，腸病毒都在哪個季節活動？①春季②夏季③秋季④全年都有。
165. ( 2 ) 一般來說，感染腸病毒後約幾天會發病？①當天②3到5天③14天④1個月。
166. ( 1 ) 下列哪些是腸病毒的傳染途徑？A. 咳嗽打噴嚏；B. 接觸腸病毒患者皮膚水泡潰瘍；C. 患者糞便。①ABC②AB③AC④BC。
167. ( 2 ) 下列何者較易感染腸病毒？A. 新生兒；B. 孕婦；C. 小學生；D. 65歲以上的老人。①ABD②ABC③ACD④BCD。
168. ( 3 ) 感染腸病毒的小孩，到何時才完全無傳染力？①症狀改善後②1週後③8到12星期後④10天後。
169. ( 4 ) 感染腸病毒時，為不傳染給其他小朋友，最好請假多少天？①1天②3天③5天④7天(含)以上。
170. ( 1 ) 感染腸病毒71型常見的症狀與併發症，下列何者正確？A. 39°C以上高燒；B. 手足口病；C. 嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐等；D. 皮膚發疹嚴重。①ABC②ABD③ACD④BCD。
171. ( 2 ) 感染腸病毒後，中樞神經併發症多在何時出現？①與疹子同時出現②發疹後3至4天③發疹後1星期④疹子消失後。
172. ( 4 ) 下列何者不是腸病毒感染併發重症的前兆病徵？①嗜睡、手腳無力、活力不佳、意識不清②肌抽躍③持續嘔吐④皮膚癢。

173. ( 3 ) 預防感染腸病毒的方法，下列何者錯誤？①注意個人衛生習慣②避免出入擁擠公共場所③清除孳生源④提升個人免疫力。
174. ( 2 ) 幼兒感染腸病毒時，應注意下列哪些？A. 是否有腸病毒感染併發重症前兆病徵；B. 注意第二個病患尤其是嬰幼兒；C. 小心處理病童的排泄物，且處理完後應立即洗手；D. 為病童添加衣物保暖。①ABD②ABC③ACD④BCD。
175. ( 2 ) 一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，其有效氯的濃度大約是多少？①2 到 3%②5 到 6%③10 到 12%④20 到 30%。
176. ( 4 ) 以一般民眾自行購買之市售含氯家用漂白水，配置成 10 公升 200ppm(0.02%)溶液，需要多少量之漂白水？①10cc②20cc③30cc④40cc。
177. ( 1 ) 下列哪個年齡層為腸病毒感染併發重症的高危險群？①0 到 5 歲②5 到 9 歲③10 到 14 歲④15 歲以上。
178. ( 4 ) 容易導致嚴重併發症的最主要腸病毒型別為①克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16 型②伊科病毒(Echovirus)第 6 型③克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型④腸病毒(Enterovirus)71 型。
179. ( 3 ) 依據歷年監控資料，導致死亡的最主要腸病毒型別為①伊科病毒(Echovirus)第 11 型②克沙奇病毒(Coxsackievirus)A16 型③腸病毒(Enterovirus)71 型④克沙奇病毒(Coxsackievirus)B3 型。
180. ( 2 ) 日本腦炎的潛伏期有多久時間？①1 到 3 天②5 到 15 天③一個月④三個月。
181. ( 3 ) 台灣傳播日本腦炎的病媒蚊，下列何者錯誤？①白頭家蚊②環紋家蚊③埃及斑蚊④三斑家蚊。
182. ( 3 ) 日本腦炎流行期主要在每年什麼時候？①一至七月②三至八月③五至十月④八月至次年一月。
183. ( 4 ) 日本腦炎的預防方法，下列何者錯誤？①避免蚊蟲叮咬②接種日本腦炎疫苗③戶外活動穿著長袖長褲④黃昏時在豬舍附近活動。
184. ( 1 ) 日本腦炎是否會經由人傳染給人？①不會②會③不一定④視嚴重程度而定。
185. ( 2 ) 有關日本腦炎疫苗接種後可能產生的副作用，下列哪些正確？A. 局部注射部位紅、腫、痛；B. 皮膚發疹；C. 輕微肌肉酸痛；D. 頭痛、發燒。①ABD②ACD③BCD④ABC。
186. ( 2 ) 下列何者是登革熱的感染方式？①空氣傳染②病媒蚊叮咬③接觸傳染④飲食傳染。
187. ( 4 ) 有關預防病媒傳染病的方法，下列何者錯誤？①清除孳生源②戶外踏青穿著長袖長褲③注意居家環境衛生④多喝水。
188. ( 2 ) 登革熱的潛伏期有多長時間？①1 到 3 天②3 到 8 天③15 天④30 天。
189. ( 4 ) 有關感染登革熱後免疫力的敘述，下列何者錯誤？①感染某一型登革病毒患者，則對該型病毒具有終身免疫②對其他型別僅具有短暫的免疫力，通常約為 2 到 9 個月③有可能再感染其他型別④感染某一型登革病毒後，對其他型登革病毒都有終身免疫。
190. ( 3 ) 登革熱的主要病媒蚊為埃及斑蚊，在台灣的分布狀態，下列何者正確？①全台灣皆有②台中大甲以南③嘉義布袋(北迴歸線)以南④金、馬地區。

191. ( 4 )	登革熱病媒蚊之一的白線斑蚊成蚊吸血習性描述，下列何者錯誤？①有晨昏二個高峰②日出後 1 到 2 小時和日落前 2 到 5 小時③下午高峰較上午高④夜晚 10 點至 12 點。
192. ( 3 )	登革熱俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病，主要呈現發燒、出疹、肌肉骨骼疼痛等症狀，依抗原性可分為幾型？①2 型②3 型③4 型④5 型。
193. ( 4 )	登革熱病媒蚊孳生源清除，主要實施策略為何？A. 建立病媒蚊孳生地通報機制及普查列管；B. 環境整頓、容器減量與孳生源清除；C. 噴灑滅蚊藥劑；D. 督導考核。①ABD②BCD③ACD④ABCD。
194. ( 3 )	政府目前提供 B 型肝炎免疫球蛋白免費接種之對象為①所有新生兒②所有 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒③高傳染性 B 型肝炎帶原媽媽所生之新生兒④65 歲以上老人。
195. ( 2 )	有關腸道傳染病之預防方法，下列何者錯誤？①照顧小孩前應確實洗手②只要出國前施打疫苗就可以避免，不需特別注意飲食衛生③食用充分煮熟之食品④不吃路邊攤冰品。
196. ( 1 )	有關腸道傳染病之敘述，下列何者錯誤？①腸道傳染病之致病原皆為細菌②經由病人嘔吐物或糞便污染水或食物而感染③可經由病媒(蒼蠅或蟑螂等)傳播④依致病菌量的多寡及個人抵抗力的強弱，病患會有輕重不同的症狀。
197. ( 2 )	有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①小兒腹瀉不用擔心，這個過程可以自然地提高免疫力②出現腸道傳染病疑似症狀，應儘速就醫治療③腸道傳染病都是由不好的細菌所引起，按時的服用抗生素可以避免疾病傳播④腹瀉、咳嗽及流鼻水都是腸道傳染病常見的症狀。
198. ( 4 )	有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①生食可能感染腸道傳染病，一定要搭配芥末、青蔥或薑等醬料食用，才能完全殺菌確保安全②進口的生蠔乾淨無污染，生食沒有感染腸道傳染病的風險③山上的野果野莓可能遭到小動物排泄物污染，吃了可能會拉肚子，就近用溪水或泉水清洗才安全④避免生食冷飲。
199. ( 4 )	有關腸道傳染病之認知，下列何者正確？①出國前先接種腸道傳染病疫苗，才可以安心地飲食②細菌是由蛋白質組成，且蛋白質加熱到 60°C 就會開始凝固，以此溫度烹調食物，就可以完全消滅病菌③腸道傳染病的感染者都會出現腹瀉及嘔吐的症狀④避免生食冷飲。
200. ( 1 )	嬰兒發生梗塞，仍有意識，須立即操作的步驟為①拍擊背部②頭部後仰③按壓胸部④電話撥打 119。
201. ( 1 )	操作嬰兒人工呼吸，每次吹氣的時間為？①1 秒鐘②2 秒鐘③3 秒鐘④5 秒鐘。
202. ( 2 )	操作心肺復甦術，每個循環胸部按壓和人工呼吸的比為①15：1②30：2③5：1④10：2。
203. ( 2 )	為梗塞嬰兒拍擊背部的位置為①乳頭連線下的胸骨處②兩肩胛骨的中間③兩腋下連線間④腰背部中間。
204. ( 1 )	施行心肺復甦術，嬰兒胸部按壓的位置為①乳頭連線下的胸骨處②兩肩胛骨的中間③兩腋下連線間④肚臍上方兩指處。

205. ( 1 ) 下列何種原因造成的嬰兒呼吸心跳停止，應立即施行心肺復甦術？A. 異物梗塞；B. 呼吸急症；C. 一氧化碳中毒；D. 心臟病。①ABCD②BCD③ACD④ABD。
206. ( 2 ) 呼吸心跳突然停止，腦部缺氧多少時間後會造成腦細胞損傷？①2-3 分鐘②4-6 分鐘③5-10 分鐘④10-15 分鐘。
207. ( 3 ) 操作何種急救步驟，須持續地壓額提下巴？A. 暢通呼吸道；B. 拍擊背部；C. 心臟按摩；D. 人工呼吸。①ABC②BCD③ACD④ABD。
208. ( 2 ) 為嬰兒清潔頭部，應採何種抱姿？①安全懷抱②橄欖球式抱法③搖籃式抱法④直立式抱法。
209. ( 2 ) 為幼兒刷牙應採何種刷法？①左右來回橫刷②刷毛固定位置後左右擺動方式③上下來回刷④由牙齦刷至牙冠。
210. ( 3 ) 為嬰兒洗澡的操作原則，其重要性依序為何？A. 保暖；B. 清潔；C. 安全；D. 親子互動；E. 刺激生長發育。①ABED②CDEA③CABD④EDBC。
211. ( 4 ) 嬰兒體溫易自體表散失的原因，下列何者錯誤？①皮膚薄②體溫調節中樞未成熟③皮下組織少④體表面積小。
212. ( 1 ) 有關嬰兒骨骼的敘述，下列何者錯誤？①含膠原纖維多，易造成粉碎性骨折②易彎曲而不易折斷③骨骼較軟有彈性④可塑性強但無法承受較重之負荷。
213. ( 4 ) 為嬰兒急救暢通呼吸道，要呈何種姿勢？①極度後仰②重度後仰③中度後仰④輕度後仰。
214. ( 2 ) 下列哪些生理因素，是造成嬰幼兒呼吸較成人快的原因？A. 肺泡數量少；B. 胸腔小；C. 氣管及支氣管比例較成人小；D. 呼吸控制中樞尚未成熟。①ABC②ABD③BCD④ACD。
215. ( 2 ) 為嬰兒預備洗澡水，下列何者錯誤？①先放冷水再放熱水②水溫與室溫相近③水量為澡盆的 1/2 至 2/3④可以手腕內側來測水溫。
216. ( 1 ) 確定梗塞嬰兒已無意識，應立即採取的步驟為①呼叫救援②檢查及清除口腔的異物③暢通呼吸道④執行人工呼吸。
217. ( 3 ) 預防幼兒氣喘發生的原則，下列何者錯誤？①規律的生活作息②裝潢簡單、不用填充式的布製傢俱③室內保持溫暖潮溼的狀態④適度的運動。
218. ( 1 ) 侏儒症是幼兒期何種內分泌不足所造成？①生長激素②副甲狀腺素③甲狀腺素④腎上腺素。
219. ( 4 ) 新生兒容易出現黃疸，是因為下列哪個器官尚未成熟？①胰臟②胃③脾臟④肝臟。
220. ( 2 ) 幼兒鼻出血，下列處理方式何者錯誤？①維持坐姿向前傾②安靜躺下休息③在鼻翼兩側直接加壓止血④鼻樑上給予冷敷。
221. ( 3 ) 依我國交通安全法規規定，幾歲以下的兒童不可單獨留置於車內？①十歲②八歲③六歲④國中以前。
222. ( 3 ) 近年來，一歲以上兒童死亡的主要原因為①惡性腫瘤②先天性畸形③事故傷害④他殺。
223. ( 3 ) 增加幼兒抵抗力，避免常生病的方法，下列何者正確？A. 新生兒儘量以母乳餵食；B. 定期施打預防針；C. 多補充市售的健康食品；D. 良好的衛生習慣。①ABCD②ABC③ABD④BCD。

224. ( 4 ) 水痘的傳染性極高，患者須隔離至何時為止？①退燒時②結痂時③出疹後④痂皮脫落。
225. ( 1 ) 幼兒出現高燒、意識障礙、痙攣、頸部僵硬，其可能的疾病為①日本腦炎②麻疹③腮腺炎④登革熱。
226. ( 2 ) 小兒麻痺病毒主要是侵入人體的哪一部分？①內分泌系統②中樞神經系統③消化系統④心血管系統。
227. ( 3 ) 預防接種的注意事項，下列何者正確？A. 接種後輕微發燒屬正常現象；B. 接種後若發燒攝氏 38.5 度以上，應立即就醫；C. 幼兒生病發燒時，仍應按時接種疫苗；D. 注意接種部位的清潔，以免細菌感染。①ABCD②ABC③ABD④BCD。
228. ( 2 ) 給嬰幼兒用藥，下列哪些是正確的？A. 勿任意給服成藥；B. 病況嚴重時，要加大劑量；C. 服藥時以開水吞服；D. 可放入奶水或果汁中一併服用；E. 按醫師處方，飯前或飯後吃。①ABC②ACE③ABE④BCD。
229. ( 2 ) 處理開放性創傷，下列何者正確？A. 穿刺物要先拔除再消毒；B. 已撕裂的組織勿剪掉；C. 無穿刺物傷口先加壓，並抬高傷處以止血；D. 脫落的組織清洗後，泡入鹽水中送醫；E. 表淺傷口以生理食鹽水洗淨傷口，再作後續處理。①ABC②BCE③ACD④CDE。
230. ( 4 ) 創傷處理的注意事項，下列何者正確？A. 先除去傷口上的血凝塊；B. 不可任意移動覆蓋傷口的紗布；C. 不可給嘔吐或昏迷的患童進食飲料或食物；D. 抬高受傷部位以助止血。①ABC②ACD③ABD④BCD。
231. ( 1 ) 有關燒燙傷的處理方法，下列何者正確？①以乾淨的冷水沖患部以降低熱度②在患處塗抹軟膏或油脂③小心的將水泡弄破④立刻將黏住皮膚的衣服剝除。
232. ( 4 ) 被螞蟻、臭蟲咬傷時，可塗抹在患處以止痛、止癢消腫的藥物，下列何者正確？①紫藥水②優碘③雙氧水④氨水(阿摩尼亞)。
233. ( 3 ) 瓦斯燃燒不完全會產生何種物質而導致吸入性中毒？①二氧化碳②一氧化氮③一氧化碳④甲烷。
234. ( 3 ) 給予幼兒安全教育，下列何者正確？A. 培養幼兒對安全認知的概念；B. 事前強調安全，提醒注意；C. 禁止與限制幼兒的活動，以減少傷害；D. 培養幼兒維護自身安全的能力。①ABC②BCD③ABD④ABCD。
235. ( 4 ) 幼兒的耳朵塞入豆子時，採用下列何種處置最適合？①耳道滴入少許油，使豆子隨著油流出②以燈光照耳道，以小夾子夾出豆子③側頭單腳跳，讓豆子掉出④不要自行嘗試將豆子取出，立即送醫院處理。
236. ( 2 ) 幼兒意外事故處理的方法，下列何者錯誤？A. 誤食清潔劑中毒，立即施予催吐；B. 有異物入眼，用生理食鹽水將它沖出；C. 鼻出血時，立即平躺將頭部抬高，或以棉花塞住鼻孔；D. 中暑時，給予平躺腿部抬高。①ABC②ACD③BCD④ABCD。
237. ( 3 ) 衛生福利部實施全國新生兒先天代謝異常疾病篩檢，其服務補助項目，目前包含幾項疾病？①5 項②6 項③11 項④12 項。
238. ( 4 ) 下列哪一項不是乳牙具有的功能？①咀嚼食物②正確發音③美觀並維持恆齒所需的空間④減少口腔疾病。

239. ( 1 ) 醫學界建議新生兒聽力篩檢應於何時進行，以早期發現其聽力問題？①24~60 小時②14 天③1 個月④2 個月。
240. ( 4 ) 有關口腔衛生保健觀念的敘述，下列哪些正確？A. 幼兒長出乳齒時，須定期做口腔檢查；B. 儘早給予使用含氟牙膏以預防齲齒；C. 嬰幼兒口腔保健從出生後即開始進行；D. 均衡飲食有助於口腔保健。①ABC②BCD③ABD④ACD。
241. ( 3 ) 國健局規定未滿 5 歲的幼童，多長時間可到牙科做一次免費的牙齒保健檢查，並做牙齒塗氟處理避免蛀牙？①2 個月②3 個月③6 個月④12 個月。
242. ( 4 ) 照護者為早期發現嬰幼兒生長發育異常徵兆，最簡單可行又有用的基本技術為①體溫測量②預防接種③體能活動④健康觀察。
243. ( 4 ) 下列哪一項不是造成幼兒早期性齲齒的原因？①細菌②醣類的食物③飲食的數量與頻率④長牙的時間。
244. ( 2 ) 嬰兒長牙的徵象與處理方式，下列哪一項正確？①乳牙一定在 6 個月以後才會長出②長牙時為緩解不適，可提供較硬可咬的東西③長牙時通常會有發燒、腹瀉、紅疹現象④長牙時給予多喝開水。
245. ( 1 ) 有關幼兒視力不良的敘述，下列哪些正確？A. 弱視治療最佳年齡是 3~5 歲；B. 遮眼療法是將視力較好的一眼遮蔽，以使視力慢慢恢復；C. 矯正近視須配戴凹透鏡；D. 角膜手術在年齡愈小時做愈好。①ABC②BCD③ACD④ABD。
246. ( 1 ) 幼兒的視力問題在幾歲以前獲得治療，將有極高的治癒機會？①6 歲②8 歲③10 歲④12 歲。
247. ( 4 ) 下列哪些為視力保健的正確方法？A. 眼睛與書本應保持 35~40 公分的距離；B. 用眼時間每 30 分鐘，應讓眼睛休息 10 分鐘；C. 閱讀光源應來自左後方；D. 幼兒不宜學習使用電腦。①ABC②BCD③ACD④ABD。
248. ( 3 ) 醫學上所謂的發燒是指體內溫度高於多少度？①37°C②37.5°C③38°C④38.5°C。
249. ( 2 ) 下列何者為嬰幼兒健康照護的首要之務？①營養供給②預防保健③特殊保護④體能活動。
250. ( 3 ) 下列哪些是衛生福利部規劃，提供嬰幼兒成長的健康元素？A. 母乳哺育；B. 預防接種；C. 增進體能活動；D. 刺激生長發育。①ABD②ACD③ABC④BCD。
251. ( 4 ) 下列哪一個為藥物的主要代謝器官？①腸胃道②腎臟③肺臟④肝臟。
252. ( 3 ) 嬰兒哭鬧不安時，下列哪一種給藥方式最適合？①將嬰兒鼻子捏住，讓其嘴巴張開後，以滴管懸空不觸及嘴巴，緩慢滴入藥水②以餵藥器裝著藥水，對準喉嚨中央迅速灌入③安撫嬰兒待其安靜後，以滴管置於舌頭邊慢慢滴入藥水，並留意其吞嚥的狀態④將嬰兒嘴巴撐開後，快速以湯匙灌入口內。
253. ( 4 ) 下列哪一項是台灣地區造成嬰幼兒氣喘最常見的過敏原？①花粉②黴菌③海鮮④塵蟎。
254. ( 3 ) 當幼兒有抽搐現象時，下列哪些是適當的處理方法？A. 嘴巴扳開，將硬物放入壓住舌頭；B. 將尖銳物品移開；C. 固定四肢並按住抽動的頭部；D. 將頭偏向一側；E. 陪在旁邊並觀察發作的型態。①ABC②ABD③BDE④CDE。



255. ( 4 ) 有關幼童期常見的泌尿道感染的敘述，下列哪一項錯誤？①女幼童發生的機會比男幼童高②多喝水、不憋尿是預防再次感染的方法之一③年齡愈小的病童症狀愈不明顯④使用抗生素治療效果好，沒有症狀即可停藥。
256. ( 4 ) 下列哪一項不屬於危害幼兒安全的個人特質因素？①身體發展狀況②年齡③智力④出生序。
257. ( 1 ) 嬰幼兒生活的環境，具有刺激其內在潛能的功能，下列選購設備之考量何者錯誤？①灌輸知識②有益健康③安全原則④考慮能力需要。
258. ( 4 ) 下列哪一項不符合托育環境規劃原則？①易於觀察或記錄幼兒活動②有足夠讓嬰幼兒活動、探索的空間③合乎安全原則④擺設許多精美傢俱。
259. ( 1 ) 下列敘述何者錯誤？①避免嬰幼兒到處亂爬，宜多使用嬰兒床或學步車②儘可能留出安全空間讓幼兒去爬③扶物站立時，不要害怕受傷倒下，應鼓勵嬰幼兒再站起來④在安全的考量下，提供孩子到處去碰、摸、抓的機會。
260. ( 3 ) 學習環境的佈置，下列何者錯誤？①跟著孩子的經驗與感覺走②配合孩子的特質與生活經驗③配合保母的喜愛④配合孩子的能力與需要。
261. ( 4 ) 幼兒活動室的圖飾佈置，正確原則為①以幼兒作品為圖片佈置的唯一來源②儘量用鮮艷對比的顏色③吊飾應掛在天花板或高處④以幼兒興趣與相關活動為佈置主題。
262. ( 3 ) 室內空間安排的原則，下列何者錯誤？①材料取用方便②滿足個人或團體需要③空間愈大，幼兒更具安全感與歸屬感④易於成人觀察或記錄。
263. ( 1 ) 有規劃且具創造性的遊戲場特徵，下列何者正確？A. 多樣化的設施；B. 常是集中擺設；C. 常各自獨立而散布；D. 鐵製器材。①AB②ABD③AC④ACD。
264. ( 4 ) 幫助小孩在小區域中增加大動作的遊戲，空間的設計上要加入下列何者設施？A. 蹺蹺板；B. 木馬；C. 攀爬網；D. 小型滑梯。①ABD②AD③BC④CD。
265. ( 1 ) 學習環境的安排方式，下列何者不適宜？①能反映出環境的結構面②視幼兒的需要而改變其開放性或限制性安排③能反映出家庭的柔和面④提供高、低活動性的活動。
266. ( 2 ) 有關幼兒的活動室門窗設備，下列哪一項較為適宜？①門應向內開，每間活動室至少有兩個門②門應向外開，每間活動室至少有兩個門③門應向內開，每間活動室至少有一個門④門應向外開，每間活動室至少有一個門。
267. ( 3 ) 幼兒活動室之地板，下列何者錯誤？①抗火性②不宜打蠟③地面應堅硬④使用靜音材質。
268. ( 3 ) 有關二歲到三歲的幼兒使用鞦韆的敘述，下列何者正確？A. 座位材料最好用木製；B. 座位材料最好是特製帆布；C. 幼兒一律為坐式；D. 幼兒可以站式、坐式自由變化。①AC②AD③BC④BD。
269. ( 4 ) 下列何者不是引導幼兒良好行為的有效方法？①即時警告②事前叮嚀③告訴他什麼可以做④只告訴他什麼不可以做，而未告知原因。
270. ( 4 ) 幼兒在遊戲過後不肯收拾玩具時，下列何者處理方式不適合？①事先訂立好規則②溫和而堅定地要求幼兒一定要收拾，否則不能再繼續玩下面的活動③減少部分個人特權④大人幫他收拾。
271. ( 4 ) 保母對幼兒常常問的「為什麼？」，應有的回應方式為何？①此係幼兒的習慣問話，以點頭，或「嗯！」來回應②重複幼兒的問話，並以兒語來回

<p>答③告訴孩子，「我已經告訴過你了！想一想是什麼？」④細心傾聽、認真回答，並可以反問。</p>
<p>272. ( 1 ) 良好社會環境的安排不包括①提供單一、固定的學習規範②多用選擇、轉移的引導方式③尊重幼兒、關心幼兒④引導幼兒適當發洩情緒。</p>
<p>273. ( 3 ) 安排嬰幼兒活動的作息時間，下列哪一種方式不適宜？①提供幼兒各種不同的經驗②包含各類型活動③活動時間要固定並控制好④動、靜活動要相互搭配。</p>
<p>274. ( 2 ) 在充滿關愛與接納的家庭中長大的孩子，會形成下列何種人格特質？①傲慢、暴躁②自信、愛人③膽怯、害羞④依賴、無責任感。</p>
<p>275. ( 2 ) 幼兒期是培養基本習慣的最佳時期，這是依據幼兒的何種特性？①未分化性②最富模仿性、可塑性③自我中心④想像力。</p>
<p>276. ( 2 ) 引導嬰幼兒玩遊戲時，保母不該①允許自由操作、試探②干涉其玩法③留意觀察，適時補充或減少器材④注意幼兒的安全。</p>
<p>277. ( 4 ) 提供嬰幼兒良好的情緒環境，下列何者非必要條件？①美好的音樂②有趣的圖書和玩具③可供發洩情緒的角落或玩偶④過度的裝潢。</p>
<p>278. ( 3 ) 嬰幼兒作息的安排，下列何者錯誤？①應注意嬰幼兒生理需求②每天活動結束前，宜留時間與幼兒討論今天活動③讓嬰幼兒在全天活動過程中感到緊湊、刺激與興奮④讓嬰幼兒在活動中有安全感。</p>
<p>279. ( 2 ) 保母在選擇或設計教材時，最應注意的原則是①能為進入托兒所預作準備者②要以幼兒能直接經驗者③能符合幼兒及其家長之需求者④要能培養幼兒抽象思考能力者。</p>
<p>280. ( 4 ) 有關幼兒遊戲的設計，下列何者不適宜？①配合動作發展的順序及原則②利用戶外的遊戲器材來設計③利用廢物設計遊戲道具④購用電動玩具。</p>
<p>281. ( 1 ) 在嬰幼兒期要多提供孩子豐富的觸覺刺激，其中最有效的遊戲是①玩沙②玩拼圖③玩積木④玩玻璃球。</p>
<p>282. ( 2 ) 發展幼兒的體力，熟練其運動器官，以增進手腳的技巧，是屬於①感覺遊戲②體能遊戲③社會性遊戲④戲劇性遊戲。</p>
<p>283. ( 3 ) 欲使幼兒獲得平衡感的學習經驗，可利用下列何者設備？①滑梯②沙坑③翹翹板④單槓。</p>
<p>284. ( 4 ) 幼兒畫畫時，不適宜的指導技巧為①充實幼兒的感官經驗②遊戲化、趣味化或配合身體動作③注意良好工作習慣和態度的培養④規定畫出有物象的圖畫來。</p>
<p>285. ( 4 ) 培養幼兒空間知覺，可採用下列何種遊戲活動？①在日曆上指認假日與數字的遊戲②以兩糰一樣大的黏土，一糰保留原來形狀，一糰搓成長條形的東西③將兩個同型式的茶杯裏的水，分別倒進兩個不同型式的容器內④玩開車的遊戲，駛向前或後退，向左彎或右拐等。</p>
<p>286. ( 4 ) 當幼兒用繪畫與他人溝通時，大人不應該有的反應是①對幼兒的繪畫語言要仔細聆聽②適度的給予回應③不時的給予讚美④給予具體示範。</p>
<p>287. ( 2 ) 建立幼兒數的概念時，不適宜用下列何種技巧？①讓幼兒能夠一個數目一個數目的對應②讓幼兒重複背誦 1-100③利用身邊的東西數，如筆、雪花片④用手指幫忙一起數。</p>

288. ( 2 ) 下列何者對幼兒來說，是一種單向的被動學習？①畫圖②看電視③玩水④說故事。
289. ( 1 ) 下列哪一種材質予人柔軟、溫馨、易摺疊的感覺？①布②木③紙④塑膠。
290. ( 3 ) 辨別四個月大的嬰兒是否正常，可以觀察哪些項目？A. 能與人保持長時間眼睛接觸；B. 能將焦點和注意力集中在一物體上；C. 趴著時能將頭抬至 20 度；D. 能經常以微笑回應父母。①AB②ABC③ABD④ABCD。
291. ( 1 ) 下列何者屬於開放性的教具？①積木②拼圖③迷宮圖④著色遊戲。
292. ( 2 ) 能促進幼兒語文發展的玩具有哪些？A. 日常用品圖卡；B. 扮家家酒玩具；C. 七巧板；D. 玩偶。①ABC②ABD③BCD④ACD。
293. ( 3 ) 應如何幫助嬰幼兒養成良好的睡眠習慣？A. 提前通知孩子睡覺時間；B. 六個月大以後可以訓練獨睡的習慣；C. 養成睡前小便的習慣；D. 先玩激烈的床上運動以助睡眠。①ACD②AC③ABC④BC。
294. ( 4 ) 放置嬰兒床時，應考慮什麼因素？①要靠窗邊，空氣較流通②宜放走道上，照顧比較方便③光線明亮的地方④可緊靠大人床，讓幼兒感覺與大人在一起，而又有獨立的空間。
295. ( 4 ) 指導幼兒常規的正確態度是①絕對禁止②一有犯錯，予以嚴厲處罰③放任自由④明確告訴幼兒什麼可以做，什麼不宜做。
296. ( 4 ) 對於幼兒玩具的使用與收拾，保母適宜的作法為何？①將玩具全部放入大紙箱內②孩子較少主動去玩的玩具可放在玩具架的下方③將所有的玩具都一次呈現在玩具架上④將玩具輪流呈現在玩具架上。
297. ( 2 ) 關於幼兒安全環境，下列敘述何者錯誤？①是指能讓幼兒學習保護自己的身體，避免傷害的發生②是指讓幼兒生活在一個防護周到，以免跌碰的環境③是指提供幼兒適性發展所需的設備與環境④是指能培養幼兒具有判斷危險及避開意外的能力。
298. ( 2 ) 啟發嬰幼兒學習的能力，下列何者正確？①所有的事情都得靠大人教，孩子才學得會②成人隨時學習新知，保持高度的好奇心，可讓孩子模仿並激發對學習新事物的興趣③多提供挫折的機會以刺激學習④讓孩子多聽、多看、少做少問。
299. ( 4 ) 「媽媽喜歡看你跳舞！來跳個舞看看！」，這句話與下列何者較無關係？①製造練習機會②培養創造力③增加親子關係④建立良好習慣。
300. ( 2 ) 下列玩具中，哪一項對幼兒來說是屬安全玩具？①芭比娃娃②毛巾布球③塑膠球④陶製玩偶。